

Reviscon® Mono 2,0 %

Guide de discussion

Apportez ce guide à votre prochain rendez-vous.

1. Qu'est-ce que Reviscon Mono 2,0 %?

Reviscon Mono 2,0 % est une injection unique d'acide hyaluronique conçue pour améliorer la lubrification et l'absorption des chocs dans une articulation du genou atteinte d'arthrose. Il est nouveau au Canada et homologué par Santé Canada (licence de dispositif médical MDALL no 110891).

2. Pourquoi choisir Reviscon Mono 2,0 %?

La formulation de Reviscon Mono 2,0 % reflète les caractéristiques associées à de meilleurs résultats cliniques dans la recherche publiée (Ferkel et al., Cartilage, 2023).

- **Poids moléculaire élevé (3 MDa)**
- **Non réticulé (structure d'AH native)**
- **Origine non aviaire (fermentation bactérienne)**
- **Viscosité élevée pour imiter le liquide synovial sain (900 000 mPa·s)**
- **Injection unique de 2,4 mL**

3. Puis-je lui faire confiance?

Reviscon Mono 2,0 % est entièrement homologué par Santé Canada et fabriqué par VSY Biotechnology, une entreprise allemande spécialisée dans les produits médicaux à base d'acide hyaluronique. Reviscon Mono 2,0 % est utilisé à l'international depuis 2015, dans plus de 30 pays.

4. Est-ce que cela peut m'aider?

Reviscon Mono 2,0 % peut être envisagé pour les personnes présentant :

- Une arthrose du genou légère à modérée
- Des symptômes persistants malgré les AINS, la physiothérapie ou les modifications d'activité
- Un objectif de retarder ou de réduire les interventions chirurgicales

5. Quel est le traitement?

- Une injection intra-articulaire (2,4 mL)
- Réalisée en clinique selon une technique aseptique
- Aucune série d'injections hebdomadaires requise
- Peut être combiné avec du PRP ou un corticostéroïde lorsque jugé approprié

6. Quel est le temps de récupération

- La plupart des personnes reprennent leurs activités normales le jour même
- Une douleur ou un gonflement léger peut durer de 24 à 48 heures

7. À quelle vitesse cela agit-il?

L'amélioration se développe habituellement de façon progressive sur une période de 2 à 6 semaines.

8. Combien de temps les effets durent-ils?

Les bénéfices durent souvent jusqu'à six mois, selon le niveau d'activité et la gravité de l'arthrose.

De nombreux patients répètent le traitement tous les 6 à 12 mois.



Scannez pour en savoir plus ou visitez
www.reviscon.ca et cliquez sur

CONTACTER

Contactez directement à :
sales@reviscon.ca